



PLAN DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE SALUD MENTAL - HTAL. DE EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS T. DE ALVEAR
PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO HOSPITAL ALVEAR
PROGRAMA DE INVESTIGACION Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Buenos Aires, 03 de Junio de 2008

Comentario de los Gráficos

En el Gráfico I observamos la prevalencia comparativa de estos seis Grupos Diagnósticos entre si en la población estudiada.

El Grafico II nos ilustra acerca de como en la observación de la distribución porcentual de la Ocurrencia de Intento de Suicidio por Diagnóstico, donde las tres patologías con menor prevalencia absoluta, son las que presentan porcentualmente la mayor prevalencia de Intento de Suicidio.

El Gráfico III condensa a los dos anteriores revelando el antedicho contraste.

De la misma forma en el Grafico IV vemos como la antedicha tendencia en términos de Intento de Suicidio se mantiene cuando analizamos la ocurrencia de más de un Intento de Suicidio, estos mismos tres diagnósticos prevalecen también.

Podemos en principio hipotetizar, en términos generales, que, estos tres Grupos Diagnósticos se constituyen, entre la población estudiada, diferencialmente como factor de riesgo en de Intento de Suicidio, en una población de por si proclive a este evento.